

DESCRIPCIÓN POST-IMPRESA DE AVES NUEVAS EN LA ARGENTINA PARA LA GUÍA AUDIORNIS QUINTA EDICIÓN 2022

Actualización periódica
en nuestra web de apoyo:
www.audiornis.org

Bernabé López-Lanús



Cita recomendada:

López-Lanús, B. 2023. *Descripción post-impresión de aves nuevas en la Argentina para la guía audiornis quinta edición (2022); Actualización periódica en nuestra web de apoyo. Última actualización: 28/ABR/2023.* Disponible en línea: www.audiornis.org. Audiornis Producciones. Buenos Aires, Argentina.

AVISO

El cierre de la GUÍA AUDIORNIS DE LAS AVES DE ARGENTINA (Quinta Edición: 2022) fue el 30 de diciembre de 2022. Hasta la fecha (28 de abril de 2023) pueden agregarse varias especies de aves nuevas para la Argentina debido a citas recientes (anoticiadas sobre el cierre del libro), posteriores a la impresión del mismo, o bien debido al caso siguiente:

Sobre la prueba de galera de la quinta edición se agregó esta observación: *“La obra de Monteleone y Pagano (2022) Listado de las Aves Argentinas, Temas de Naturaleza y Conservación N° 12, de AA/AOP; tan largamente esperada por nuestro equipo editorial durante el año 2022, recién fue liberada al público el 5 de enero de 2023 (M. Masariche com. pers.). En consecuencia se explica que no se mencione en esta guía ese importante trabajo, así figure como fecha de su publicación el año 2022.”*

Con el ánimo de mantener actualizada la *Guía Audiornis*, ya característica por su modo de edición permanente, y la posibilidad de adaptar nuestra web de apoyo www.audiornis.org para hacerle llegar al público dicha actualización, en este PDF se agregan 15 especies (taxones) para la Argentina. Admiro y vitoreo el enorme esfuerzo realizado por Monteleone y Pagano (más allá de sus sesgos y omisiones aberrantes). Creo que ahora sí, la guía Audiornis finalmente presenta todas las aves permanentes y las alguna vez registradas en nuestro país. Una guía de identificación no es un listado (*checklist*) de las aves de un estado sino una herramienta para identificar inclusive aquellas especies nunca documentadas pero sí observadas en determinado país, inclusive aquellas que se creen erróneas pero con un dejo de duda de que no lo sean. Queda para una futura guía Audiornis incluir o analizar muchos de los datos expuestos en Monteleone y Pagano (2022).

Nota: La disponibilidad de este PDF es temporal, pues en una nueva edición de la guía, las fichas de estas especies se agregarán al cuerpo principal del libro. En vista de la aparición permanente de aves nuevas para la Argentina, propio de un paisaje dinámico a escala continental y global, se recomienda a nuestros lectores revisar periódicamente nuestra web para estar comunicados, y por supuesto -si les parece bien- me actualicen o avisen sobre nuevos descubrimientos realizados en nuestro país.

¡Hasta la próxima!

Bernabé M. López-Lanus

bernabe.lopezlanus@gmail.com



CONTENIDO


ESPARVERO YUNGUEÑO Plain-breasted Hawk	<i>Accipiter ventralis</i>	IV
CHORLO DORADO EUROPEO Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>	IV
ALCARAVÁN PERUANO Peruvian Thick-knee	<i>Burhinus superciliaris</i>	IV
PITOTOY PATAS VERDES Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	V
PITOTOY VAGABUNDO Wandering Tattler	<i>Tringa [Heteroscelus] incana</i>	V
PLAYERITO OCCIDENTAL Western Sandpiper	<i>Calidris mauri</i>	V
COTORRA DE KRAMER Rose-ringed Parakeet	<i>Alexandrinus [Psittacula] krameri</i>	VI
COLIBRÍ CHICO Green Violet-ear	<i>Colibri thalassinus [C. cyanotus]</i>	VI
SUIRIRÍ GARGANTA BLANCA White-throated Kingbird	<i>Tyrannus albogularis</i>	VI
DORMILONA ENANA Little Ground-tyrant	<i>Muscisaxicola [Syrtidicola] fluviatilis</i>	VII
URRACA CRESTADA Curl-crested Jay	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	VII
ZORZALITO CARA GRIS Grey-cheeked Thrush	<i>Catharus minimus</i>	VII
ARAÑERO DE WILSON Wilson's Warbler	<i>Cardellina pusilla</i>	VIII
REINITA PEREGRINA Tennessee Warbler	<i>Leiothlypis [Vermivora] peregrina</i>	VIII
FRUTERO CARA NEGRA Black-faced Tanager	<i>Schistochlamys melanopis</i>	VIII



ESPARVERO YUNGUEÑO *Accipiter ventralis*

Plain-breasted Hawk

1 0205b



Mr San Vicente de Chucuri, Santander, Colombia

Larry Hubble (FLICKR)



Mb Valle Tandyapa, Pichincha, Ecuador

Nick Athanas (FLICKR)

♂27 ♀38 cm 400-2800 m

Observado 1 ind. en el PN Callegua (El Monolito) en 2005 por M. Juhant, y cuatro registros posteriores de observaciones en PN Callegua (y alrededores) y en el PP Potrero de Yala (Jujuy) resumidos en Monteleone y Pagano [2022: *List. Aves Argentina*]. **Ventral sin estrias (a):** no estriado como en el Esparvero Común. **Morfo rufo, blanco o NEGRO (siempre con ventral uniforme).** J: el juvenil Si presenta estriado. Voz: reclamo típico (p.e.) sensiblemente más grave que el taxón *erythronemius*. Simpátrico con *Accipiter erythronemius*. Desde Venezuela hasta el centro de Bolivia. Nuboselva, yungas.

0205b. *Accipiter ventralis*, Sclater, 1866. 1/10

CHORLO DORADO EUROPEO *Pluvialis apricaria*

Eurasian Golden Plover

0283b



José M. Armengod (FLICKR) Stefan Berndtsson (FLICKR)



Carmelo López Abad (EcoR) Michele Lamberti (FLICKR)

28 cm 0 m
Incluida en el listado de Malvinas sin datos concretos en Strange [1992: *Wildlife of the Falkland Islands*]. Es necesaria su confirmación con mayores detalles, especie muy parecida al Chorlo Pampa *P. dominica*, registrada varias veces en Malvinas. Monteleone y Pagano [2022: *List. Aves Args.*] la incluyen como hipotética. **Ventral del ala blanco (a):** no oscuro como en *P. dominica*. **Dorsal** por lo general **muy dorado** (más que en *P. dominica*). Banda alar blanca apenas marcada, pero notoria. **Casi sin ceja (b):** no bastante marcada. Punta del ala casi igual o apenas más larga que la punta de la cola. J: sin marca auricular marrón, vientre bastante escamado (no blanco uniforme como el adulto). Voz: canto muy similar a *P. dominica*. De Europa. Marismas, praderas.

0283b. *Pluvialis apricaria*, Linnaeus, 1758. 2 spp

ALCARAVÁN PERUANO *Burhinus superciliaris*

Peruvian Thick-knee

1 0293b



Pablo Eguía (EcoR)



Alec Earnshaw (EcoR)

Pablo Eguía (EcoR)


41 cm 3000 m

Obs. 2 inds. en el P.N. San Guillermo, San Juan, 3/ABR/1999, por A. Bodratti [Pagano y Bodratti, en prep. en Monteleone y Pagano 2022: *Listado Aves Argentinas*]. **Voluminoso.** **Cabezón,** ojos muy grandes amarillentos. **Ceja blanca con contrastada sobreceja negra (a).** Plumaje arenoso algo salpicado de más claro. J: muy salpicados (escamado) de blancuzco en espalda y flancos del pecho. Voz: cadencia de Tero (*Vanellus*) y de Avoceta Andina (*Recurvirostra andina*). Zonas mayormente áridas con suelos desnudos o pastos cortos, con o sin arbustales dispersos.

0293b. *Burhinus superciliaris*, Tschudi, 1843. 1/1

PITOTOY PATAS VERDES *Tringa nebularia*

Common Greenshank



Michele Lamberti (FLICKR)
Andrey Gulivanov (FLICKR)



Gerjtan van Noord (FLICKR)

1 0314b

32 cm 0 m

Ind. colectado en "Buenos Ay-res" (otro en "Río de La Plata") en 1860 [Schlegel 1864 (deposítados en RMNH); en *Monteleone y Pagano 2022: Listado Aves Argentinas*]. **Mitad basal del pico gris (a):** en contraste con el resto negro. **Patatas olivo-verdosas (b).** **Franja blanca** en la mitad del dorso (c): **ribeteado pálido abundante.** **Ventral blanco desde la garganta (d).** **Pn: Pecho con salpicado oscuro abundante (e).** **Voz:** del estilo de los pitotoyes grande y chico (*Tringa melanoleuca* / *T. flavipes*). Oriunda del viejo con tiniente. Humedales con playas / marismas / pantanos / ríos.



0314b. *Tringa nebularia*, Gunnerus, 1767. 1/1

PITOTOY VAGABUNDO *Tringa [Heteroscelus] incana*

Wandering Tattler

0316b



Becky Matsubara (FLICKR): ambas



Don Henise (FLICKR)

Jason Crotty (FLICKR)

28 cm 0-4500 m

Foto de 1 ind. en laguna Vi-lama, Rinconada, Jujuy, 17/ FEB/2018, por F. Moschione, J. Segovia y F. Cornell (e-Bird), y 1 ind. obs. en Abra Pampa, Cochino, Jujuy, 3/ FEB/2021, por F. Moschione y J. Segovia (e-Bird): en *Monteleone y Pagano [2022: Listado Aves Argentinas]*, quienes agregan: la foto no permite descartarlo con certeza de *Tringa brevipes* [que anida en Asia, pero con algunos avistajes en N-A]. **Paticorto/cuellicorto. Gris, garganta y pecho agrisados. Supraloral blanco** (sin ceja). Posado: ala más larga que la cola. Canal narial: casi tres tercios del pico. **Patatas amarillas. Pico mayormente ne gro.** **Pn:** barrado ventral notorio. **Voz:** trino ondulante bastante rápido, bajo y melancólico. Generalmente en rocas junto al agua.




0316b. *Tringa incana*, Gmelin, 1789. 1/1

PLAYERITO OCCIDENTAL *Calidris mauri*

Western Sandpiper

1 0326b

16 cm 3500 m



Heather Paul (FLICKR)

NatureShutterbug (FLICKR)




Don Henise (FLICKR)

Obs. 1 ind. en Laguna de Los Pozuelos, Jujuy, 19/OCT/2016, por J. Q. Vidoz (ebird): en *Monteleone y Pagano [2022: Listado Aves Argentinas]*. **Pico algo caído en la punta (a) con punta bastante fina:** no pico recto con punta bastante gruesa como en el P. Enano *C. pusilla* (con el cual en Rs es casi indistinguible). **Patatas negras** (semipalmadas) **Dorsal mayormente gris** (no amarronado). **Por lo general collar completo** de estrías finas densas (b): no estriado difuso a los flancos del pecho con el centro sin estrías. **MUY DIFÍCIL DE DISTINGUIR DE Calidris pusilla.** **Voz:** llamadas más agudas (y no tan ásperas) que *C. pusilla*. Playas en marismas, costas de mar, agua salobres. Oriunda de NA.




0326b. *Calidris mauri*, Cabanis, 1857. 1/1

COTORRA DE KRAMER *Alexandrinus [Psittacula] krameri* Rose-ringed Parakeet



Federico J. Villegas (EcoR) Héctor B. Fernández (EcoR) Andrés Espindola (EcoR) Rodolfo A. Capdevielle (EcoR) Adrián Braidotti (EcoR)




40 cm 40 m

Registrada como exótica asilvestrada en la ciudad de Corrientes por Chatellenaz *et al.* [2022: *Neotr. Biodiversity* 8:51–55.] con reproducción exitosa desde al menos 2020. ¿Aparente extirpación por control de fauna en 2022? (*mucho mulo vía web*). Foto de 1 ind. en Franck, Las Colonias, Santa Fe, 10/DIC/2022, por L.A. Leiva [ArgentiNat & eBird]. Gama de verdes pasteles. **Collar fino negro (a)** con rosado/grisáceo en dorsal del cuello. **Pico rojo (b)**. **Cola muy larga y angosta (c)**. ♀: sin collar. Voz: *chiéerrriit* agudos no chillones (suelen permanecer silenciosos). De Asia y África. Invasor exitoso en Europa post cauterio (se espera lo mismo en Argentina si no se controla su población incipiente). Arboledas, plazas, jardines.


---. *Alexandrinus krameri*, Scopoli, 1769. 4 spp.

COLIBRÍ CHICO *Colibri thalassinus* [C. cyanotus]

Green Violet-ear



Félix Uribe (FLICKR)



Félix Uribe (FLICKR)


11 cm 700-c.2500 m

Un ind. en mano en cuesta del Clavillo, Andalgalá, CAT, 23/ENE/1993 (Bertelli *et al.* 1997: *Homero* 14:269); numerosas obs. en El Algarrobal, Cachi, SAL, por F. Moschione (p.e. 26/ABR/2007); incluido en las aves de Jujuy por Burgos *et al.* (2009): ver Monteleone y Pagano [2022: *Listado Aves Argentinas*]. **Parque auricular azul puro (a)**. **Garganta verde de (b)**: no azul unido al parche auricular como en el C. Grande *Colibri corsicans*. **Pecho verde como resto ventral (c)**: no con parche azul. **Subcaudales verdes (d)**: no blancuzcas como en el C. mediano C. *serrirostris*. Voz: llamada repetida monosilábica (*chir-ri-chik!*) o monosilábica, con la cadencia del C. *corsicans*, pero más aguda. Bordes de selva yungueña, matorrales.


0501b. *Colibri thalassinus* (sp. *crissalis*). Todd, 1942. 1/5

SUIRIRÍ GARGANTA BLANCA *Tyrannus albigularis*

White-throated Kingbird



Joao Quental (FLICKR) Félix Uribe (FLICKR)




21 cm 200 m

Fotografiado 1 ind. frente al PP Moconá (del lado brasileño), 9/NOV/2020, por D. Meller (WikiAves), el cual luego voló al lado argentino: ver Monteleone y Pagano [2022: *Listado Aves Argentinas*]. **Corona ceniza pálido (a)**: no gris como en el Suiirí Real T. *melancholicus* (no confundir por ceniza pálido plumajes captados con alta radiación solar). **Banda ocular muy contrastada (b)**. **Dorso oliva encendido (c)**: no oliva oscuro. **Garganta blanca** más notoria y extendida. **Pecho y resto ventral casi del mismo tono amarillo (d)**: no pecho más oscuro. Voz: trinos más bajos (graves) y lentos que el S. Real. Sabanas con arbustales, arboledas, selva en galería.

0799b. *Tyrannus albigularis*, Burmeister, 1856. 1/1

DORMILONA ENANA *Muscisaxicola [Syrtidicola] fluvialis* Little Ground-tyrant



John Irvine (FLICKR)

John Irvine (FLICKR)



Adriana Bellotti (EcoR)


13 cm ? m
(en Amazonia hasta c.800 m)

Un ind. colectado en "Tucumán" (sin más datos) en AGO /1908 por M. Lillo (Dabbene 1914 [Physis 1: 293-366, depositado en MACN]) parece ser el único registro certero; los restantes (¡de sitios andinos áridos!) fueron reidentificados como *M. maculirostris* (aunque discutidos); ver resumen en Pearman y Mazar Barnett (2001); y Monteleone y Pagano (2022). La especie es propia de la cuenca amazónica. Dorsal gris arena (gris sucio/limo/barroso). No tiene o casi no tiene supraloral blanco (a). La base de la mandíbula (amarillenta) casi no se ve (b). Vientre muy blancuzco (c). Borde de timonera externa: blanco (d). Voz: ? . Playas de ríos, abiertos o escarpados, con leguminosas latifoliadas o pasto corto.

0815b. *Muscisaxicola fluvialis*,
Sclater y Salvin, 1866. 1/1



URRACA CRESTADA *Cyanocorax cristatellus*



Egon Fink (FLICKR)

Aglaré Pires (Wikimedia)



Bertrando Campos (FLICKR)

Curl-crested Jay

1 0864b


36 cm 120 m

Fotografiado y grabado 1 ind. en Posadas, Misiones, desde el 5/FEB/2023, por M. Tassi (eBird); presente al menos hasta marzo [junto a urracas comunes]. **Cresta prominente en forma de arco (a).** Cabeza, dorsal del cuello y pecho negros (no con parches azules como en la Urraca Común *C. chrysops*). Resto ventral blanco. **Alas azuladas (b).** **Cola mitad azul y mitad terminal blanca (c):** no con sólo blanco en la punta. Voz: mayormente un *kiárrrrrr* áspero del estilo de la Urraca Morada *C. cyanomelas* repetido constante (la Urraca Común no emite sonidos largos ásperos). Hasta el E de Paraguay. Campos con monte y arboledas dispersas, bosques en galería; también peridoméstica/ jardines.

0864b. *Cyanocorax cristatellus*,
Temminck, 1823. 1/1




ZORZALITO CARA GRIS *Catharus minimus*



Paul Hurtado (FLICKR)

Alec Earnshaw (EcoR)



Ramiro Ramirez (FLICKR); ambas

Grey-cheeked Thrush

1 0900c

18 cm 200-c.2000 m

Un ind. obs. en la Ruta Prov. 83 entre Abra Honda y Abra Colorada, Valle Grande, Ju-juy, 3/ENE/2018 (Pagano y Bdrati en prep., en Monteleone y Pagano [2022: *Listado Aves Argentinas*]). **Loral gris (a):** no ocráceo como en el Zorzalito Boreal *C. ustulatus*. **Periocular gris (b),** no ocráceo. **Parche auricular generalmente gris (c)** o salpicado de blanco: no marrón ocráceo. Voz: canto aflautado y melódico/difónico más veloz y agudo que *C. ustulatus*. Llamada: *kierrrr* algo áspero y alto (no *up!* bajo como en *C. ustulatus*). De América del Norte, migra hasta el Norte de Bolivia. Bosque, selva.

0900c. *Catharus minimus (minimus?)*,
Lafresnaye, 1848. 1/2



ARAÑERO DE WILSON *Cardellina [Wilsonia] pusilla*

Wilson's Warbler



Pablo Eguía (EcoR)



Rosana Ursino (EcoR)
Roberto González (FLICKR)



0927b

13 cm

c.1500 m

Obs. 2 inds. en el Cerro Negro (Los Morados), San Antonio, Jujuy, ABR/2008, por Moschione y González (2009: *Relevamiento de Fauna en Fica Cerro Negro. Proyecto PRE CODEP. Asociación Bosque Modelo Jujuy*; en Monteleone y Pagano [2022: *Listado Aves Argentinas*]). Amarillo encendido con tonalidad oliva, dorsal bastante oliváceo. **Centro de la corona negro (a)**: pero a veces ausente o con pocas marcas negras. ♀/Inm: sin negro en corona. Parecida a la ♀ del A. Manglero S. *petechia* pero no tiene la cola proporcionalmente corta y ancha sino larga/angosta. Voz: *chíé,i,i,i,i* monocorde dulce y agrillado (parecido al Piquitodeoro *Catamenia analis* [1050]). De América del Norte, migra hasta Centro América. Bosque, selva.

0927b. *Cardellina pusilla*, Wilson, 1811. 3 spp.

REINITA PEREGRINA *Leiothlypis [Vermivora] peregrina*

Tennessee Warbler



Daniela Espinosa (EcoR)

Carlos Schmidt (EcoR)



Carmelo López Abad (EcoR)
Luis Vargas (EcoR)



0927c

13 cm

c.2000 m

Obs. 1 ind. (plumaje no reproduct.) en la cuesta del Obispo, Chioana, Salta, 29/MAR/2013 por Juan I. Areta y Gabriel Núñez (Areta en prep.; en Monteleone y Pagano [2022: *Listado Aves Argentinas*]). Verdoso. **Línea ocular oscura** en contraste con **ceja blancuzca (a)**. **Corona apizarrada, espalda verde oliva encendido** en reproducción. Ventral blanco sucio, subcaudales blancuzcas. Patas negruzcas. ♀/Inm: ceja y ventral amarillentos. Voz: silbos modulados dulces, en frases de tres frecuencias/modos (silbo x2 + trino); llamada: *chik* repetidos seguido con nerviosismo. De América del Norte, migra hasta el extremo N-O de Sudamérica. Bosque, montes, selva, áreas de ecotono.

0927c. *Leiothlypis peregrina*, Wilson, 1811. 1/1

FRUTERO CARA NEGRA *Schistochlamys melanopis*

Black-faced Tanager



Pablo Eguía (EcoR)



Pablo Eguía (EcoR)



0941b

18 cm

20 m

Foto de 1 ind. en PN Cierro de los Pantanos (Otamendi), camino Islas Malvinas, Campana, Bs. As., 23/DIC/2022, por H. Matheve et al. (eBird). Parecido a un Pepitero (*Sal-tator*): pág. 434. **Gris uniforme, más claro en ventral. Cara y pecho negros (a)**. Pico claro con mitad distal negruzca. Iris pardo. Patas negras. J: oliva con zona auricular amarillenta. Voz: silbos modulados dulces, algo bajos, uniformes, más veloz que el Frutero Azul S. *diadematus* [0953], no tan agudo y extendido como en el Frutero Canela S. *ru-ficapillus*; llamada: *chék*. Hasta el C-S de Brasil y Paraguay (ssp. *olivina*) y E y SE de Brasil (ssp. *amazonica*). Matorrales, ecotonos con área abiertas (pastizales).

0941b. *Schistochlamys melanopis (olivina)?*,
Scater, 1865. 1/5

GUÍA AUDIORNIS DE

LAS AVES DE ARGENTINA

FOTOS y SONIDOS

QUINTA EDICIÓN
INTEGRAL / AMPLIADA



AUDIOS
VÍA WEB

IDENTIFICACIÓN POR
CARACTERÍSTICAS CONTRAPUESTAS
y MARCAS SOBRE IMÁGENES


AUDIORNIS

BERNABÉ LÓPEZ-LANÚS

www.audiornis.org

Última actualización:
28 de Abril de 2023

Realizado por
AUDIORNIS,
Buenos Aires,
Argentina,
para la Guía Audiornis,
edición 2022.